

پژوهشی جدید از مرگ ۱۲ درصد بازماندگان کرونا در کمتر از ۵ ماه خبر می‌دهد - دیجیاتو

محمد قریشی | سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

تقریباً یکسال می‌شود که جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، اما هنوز با سوالات زیادی درباره آن مواجه هستیم. در همین راستا تحقیقات زیادی درباره آن صورت می‌گیرد که طبق یکی از جدیدترین آن‌ها در بریتانیا، نزدیک به یک سوم افرادی که بهبود پیدا کرده‌اند، در کمتر از ۵ ماه دوباره در بیمارستان بستری می‌شوند و تقریباً ۱۲ درصد هم جانشان را از دست می‌دهند.

پژوهش جدید که توسط دانشگاه «لستر» و دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) انجام شده، نشان می‌دهد برخی افراد در بلنمدت با مشکلات مختلفی از قلبی گرفته تا دیابت مواجه می‌شوند. طبق این تحقیق، ۲۹.۴ درصد از ۴۷,۷۸۰ نفری که در موج اول شیوع کرونا از بیمارستان مرخص شده‌اند، در کمتر از ۱۴۰ روز دوباره بستری شده‌اند و ۱۲.۳ درصد هم مرده‌اند.

با توجه به چنین موضوعی، آمار قربانیان کرونا می‌تواند در ماه‌های آینده افزایش چشمگیری داشته باشد. در همین راستا پژوهشگران از مقامات درخواست کرده‌اند افرادی که از بیمارستان مرخص می‌شوند را زیرنظر بگیرند.

یکی از نویسندگان این مقاله و استاد دانشگاه لستر به نام «Kamlesh Khunti» گفته:

«این بزرگترین پژوهش درباره افرادی است که پس از نجات از دست کرونا از بیمارستان مرخص شده‌اند. ظاهراً افرادی که به خانه می‌روند، با عوارض بلنمدت مواجه می‌شوند و دوباره به بیمارستان برمی‌گردند و می‌میرند. نزدیک به ۳۰ درصد افراد دوباره بستری می‌شوند که رقم بسیار بزرگی است. این موضوع نشان می‌دهد که برای بلنمدت باید آماده مقابله با کووید-۱۹ باشیم و باید به گونه‌ای این افراد پس از مرخص شدن زیرنظر باشند.»



طبق پژوهش اخیر، بازماندگان کووید-۱۹ تا ۳.۵ برابر نسبت به سایر بیمارانی که از بیمارستان مرخص شده‌اند، در مدت ۱۴۰ روز با احتمال بستری شدن مجدد مواجه می‌شوند. یکی از موارد نگران‌کننده، بروز بیماری‌های دیگر در این افراد است، در حقیقت آن‌ها با بیماری‌های دیگری مانند قلبی، کلیه، کبد و حتی دیابت دوباره بستری می‌شوند.

در حال حاضر علت دقیق بروز این بیماری‌ها در بازماندگان کرونا مشخص نشده، اما Khunti گفته:

«ما علت دقیق بروز دیابت پس از ابتلا به کرونا را نمی‌دانیم. علت این موضوع می‌تواند نابودی سلول‌های بتا برای تولید انسولین و ابتلا به دیابت نوع ۱ یا مقاومت در برابر انسولین و ابتلا به دیابت نوع ۲ باشد. با این وجود در تشخیص‌های جدید با ابتلا به دیابت مواجه می‌شویم.»

پژوهش اخیر در مرحله بررسی قرار دارد، با این حال نتایج آن نشان می‌دهد که برخی افراد حتی پس از اینکه از دست کووید-۱۹ راحت می‌شوند، باید تا ماه‌ها یا تا آخر عمر با عوارض آن دست و پنجه نرم کنند. در این میان شماری از آن‌ها جانشان را هم از دست می‌دهند.

[دیجیاتو](#)